

아바나(AVANA) 100mg

◆복용법

일반적으로 권장 복용으로서 1회 100mg을 성행위 약30분전에 경구 복용합니다.
효과와 내용성에 따라 50mg으로 감량 또는 200mg으로 증량 할 수 있습니다.
식전, 식후에 관계없이 복용하시면 됩니다.
최소 복용량으로도 효과는 기대할 수 있지만, 최대 복용량을 복용할 경우
1일 1회 이상 복용해서는 안됩니다.

◆주의사항

심장 마비, 부정맥, 협심증, 심부전 등이 있는 분 또는 병력이 있으신 분.
지난 6개월 이내에 심장 수술을 받으신 분, 뇌졸중을 일으킨 적이 있으신 분.
통제 불능의 저혈압 또는 고혈압이 있으신 분.
음경의 구조상 결함 (굴곡 음경 섬유화, Peyronie 질환 등)이 있는 분은 성행위가
어렵고 고통스러운 수 있습니다.
4시간 이상 발기가 지속된 적이 있으신 분.
발기의 소인이 될 수 있는 질환 (겸상 적혈구성 빈혈, 다발성 골수종, 백혈병 등)이 있으신 분.
망막 색소 변성증 환자 : 망막 색소 변성증 사람은 포스포디에스테레이스(PDE)
유전적 장애를 가진 증례가 소수 인정합니다.
비동맥염 허혈성 시신경 병증 (NAION) 등 심각한 시각 상실을 일으킨 적이 있으신 분.
출혈 장애가 있으신 분.
위궤양이 있으신 분 또는 병력이 있으신 분.
간 질환이 있으신 분.
신장 질환이 있으신 분.
다른 약을 사용중이신 분.
사용은 자기 책임으로 의사의 지도하에 복용하시기 바랍니다.

RGM