

카마그라 구강 젤리 (KAMAGRA Oral Jelly)

◆복용법

1. 성행위 30분~1시간전에 물과 함께 복용합니다.
2. 식사중에 카마그라 구강 젤리를 복용해도 문제는 없습니다.
3. 공복에 카마그라 구강 젤리를 복용하면 더 효과적입니다.

◆주의사항

- 일반적으로 1일 1회 성행위 약1시간전에 복용하시기 바랍니다.
- 2차복용 시간간격은 24시간 이상이어야 합니다.
- 복용후 4시간 이상 발기가 나오지 않을 경우에는 의사와 상담하시기 바랍니다.
- 혈압의 저하가 일어날 수 있으므로 운전, 육체적인 작업전에는 복용하지 마십시오.
- 질산제·산화질소공여제 (니트로·아질산 아밀·질산이소소르비드등)와 병용은 절대로 중지 해주십시오.
- 협심증·심근경색·심부전의 치료를 받고있는 분, 부정맥·저혈압 또는 고혈압, 심장 질환이 있으신 분은 복용을 삼가하시기 바랍니다.
- 신장 질환·빈혈·백혈병·과도한 비만·당뇨병·전립선 비대증이 있으신 분은 사용 전에 반드시 의사등에 상담하십시오.

◆부작용

카마그라 구강 젤리의 일반적으로 혈관 확장 작용에 의한 두통, 얼굴 홍조, 혈압 저하에 의한 현기증 또는 피부 발진등의 알레르기 증상이 있습니다.
카마그라 구강 젤리는 기분이 나빠지거나하는 증상이 있으실경우 심각한 부작용의 전조일 수 있으므로 주의를 하시기 바랍니다.

RGM