

카마그라 폴로(KAMAGRA POLO)

◆복용법

- 카마그라 폴로(POLO)는 성행위 30분전에 복용하십시오.
- 반드시 1일 1정 1회 복용하시기 바랍니다.
- 물을 사용하지 않고 그대로 씹어서 복용하시기 바랍니다.
- 복용하신후 약20분정도에서 효과가 나타나 지속 시간은 6시간 정도입니다.
- 성적 자극이 있으면 몇 번이라도 성행위가 가능합니다.
- 또한 기존 치료제에 비해 온화한 부작용과 자연 발기를 촉진하는 것도 카마그라 POLO의 특징이기도 합니다.

◆병용금지약

카마그라 폴로(POLO)와 같이 복용하시면 안되는 약이 있습니다.
병용복용금지약물을 같이 복용하시면 심장 발작이나 급격한 혈압 저하로 인하여 효과가 나오지 않을뿐만 아니라 인체에 피해가 있을수 있습니다.
이런 증상이 있으시면 복용을 중지하시고 의사와 진찰및 진단을 받으시기 바랍니다.
※ 병용 금지 약물로는 협심증(니트로글리세린), 부정맥에 사용되는 약입니다.

◆보관방법

직사광선이나 습기가없는 곳에 보관하십시오.

RGM