

카마그라 CT(씹는 타입, KAMAGRA CT)

◆복용법

카마그라 CT는 입의 점막에서 흡수하는 치료약입니다.

1. 성행위 약1시간전에 복용하시기 바랍니다.
2. 지속시간은 복용후 약6시간정도 입니다.
3. 1일 복용량은 1회1정이므로 그 이상의 복용은 삼가해 주시기 바랍니다.
4. 2차 복용은 1차 복용후 24시간이상후에 복용하시기 바랍니다.
(의약품이므로 과다복용은 절대로 삼가하시기 바랍니다.)
5. 식사에 영향이 받을수 있으므로 유분이 많은 것은 피하는것이 보다 효율적입니다.
6. 공복에 복용하는것을 추천합니다.
7. 과음은 효과를 격감시킬수 있으므로 주의하시기 바랍니다.

◆부작용

두통,홍조현상,코막힘,현기증,어지러움증등이 증상이보고되고 있습니다.

◆병용금지약

병용복용금지약물을 같이 복용하시면 심장 발작이나 급격한 혈압 저하로 인하여 효과가 나오지 않을뿐만 아니라 인체에 피해가 있을수 있습니다.

이런 증상이 있으시면 복용을 중지하시고 의사와 진찰및 진단을 받으시기 바랍니다.

※ 병용 금지 약물로는 협심증(니트로글리세린), 부정맥에 사용되는 약입니다.

◆보관방법

고온다습한 곳을 피하여 보관하십시오.

RGM