

카마그라 발포정 (Kamagra Effervescent)

◆복용법

1. 공복에 복용하시는 것이 더 효과적이라고 알려져 있습니다.
2. 식후에 복용하는 경우에는 반드시 2시간정도를 두고 복용하십시오.
3. 성행위 약1시간전에 물에 충분히 녹인후 복용하십시오.
4. 지속시간은 복용후 약 6시간 정도입니다.
5. 오렌지맛이므로 약을 싫어하시는 분도 쉽게 복용을 하실수 있습니다.
6. 복용량은 1일 1회 1정을 복용하시기 바랍니다.
의약품이므로 과다복용은 삼가하시기 바랍니다.

◆주의사항

- 일반적으로 1일 1회 성행위 약1시간전에 복용하시기 바랍니다.
2차복용 시간간격은 24시간 이상이어야 합니다.
- 복용후 4시간 이상 발기가 나오지 않을 경우에는 의사와 상담하시기 바랍니다.
- 니트로 글리세린등의 질산제·부정맥에 사용되는 안카론정은 심장에 부담을 주거나
혈중 농도가 높아질 수 있으므로 병용하는 것을 금지하고 있습니다.
- 자몽은 실데나필 성분과 궁합이 나쁘기 때문에 같이 복용하시면 안됩니다.(쥬스도 포함)
- 신장 질환·빈혈·백혈병·과도한 비만·당뇨병·전립선 비대증이 있으신 분은 사용 전에
반드시 의사등에 상담하십시오.

◆부작용

두통, 홍조현상, 코막힘, 현기증, 어지러움증등이 증상이보고되고 있습니다.

RGM