

판토스틴(Pantostin) 100ml

◆사용법

1. 1일 1회 간단하고 육모에 흔히있는 머리가 젖거나 축축함 같은 불편함이 없이 헤어 스타일도 손상하지 않습니다.
2. 본 제품에 동봉되어있는 두피 주걱을 사용하면 쉽게 바르실수 있습니다.
3. 1일 1회 (가장 좋은 시간은 밤) 두피의 탈모 범위에 바릅니다.
4. 도포할 때 병을 거꾸로 잡고 두피 주걱을 최대한 수직으로 탈모 부위에 도포합니다. 이때 병의 배를 누르면 계량 공간의 미세한 구멍보다 약액이 균일하게 돌출됩니다 (중앙 개구부의 좌우에 있는 돌출부가 가이드의 역할을하기 때문에 액이 병에서 계량 공간에 추가 흐르는 것은 아닙니다).
5. 권장 복용량(3ml)을 균등하게 분산하기 위해 두피 주걱을 수직으로 몇번이나 탈모 범위에 바릅니다.
6. 사용 후, 스크류캡을 다시 두피 주걱에 장착 병을 밀봉합니다.
7. 탈모가 개선되면 2일에 1회, 3일에 1회와 횟수를 줄일 수 있습니다.
8. 증상의 개선은 가장 빠른 경우에 사용후 1개월 후입니다. 두피 주걱을 사용하여 두피 나 탈모 범위에 직접 도포합니다.



RGM