

슈퍼 카마그라 (SUPER KAMAGRA)

◆복용법

1. 성행위 전에 약30 ~1시간 전에 복용하십시오.
2. 복용후 약 20 정도에서 효과가 나타날수도 있습니다.
3. 성적 자극에 의해 발기하기 때문에 데이트중에 복용해도 문제는 없습니다.
4. 복용후 약5시간정도 지속됩니다.
5. 식사에 영향을 받을수 있으므로 식전 또는 식후에 복용하여 효과가 다를수 있으므로 주의하시기 바랍니다. 식후에 복용하는 경우에는 2시간 정도후에 복용하십시오.
6. 반드시 1일 1회 1정을 복용하십시오.
(1차 복용후 24시간후에 2차 복용을 하시기 바랍니다.)

◆부작용

두통·매스꺼움·구토·현기증등이 보고되고 있습니다.

◆병용금지약

슈퍼 카마그라는 하기의 약과 절대로 병용복용을 하시면 안됩니다.

항진균제(케토코나졸)·강한 진통제 (염산트라마돌)·비치료 (프로테아제 억제제)·항생제 (리네졸리드) 등과 병용하지 마십시오.

부작용이 강하게 나오거나 약의 효과가 클수도 있습니다.

◆보관방법

25 ℃ 이하의 서늘한 곳에 습기없는 곳에 보관하십시오.

RGM