

뉴욕캔디(NYC) & 뉴욕캔디핑크(NYC PINK)의 사용설명서

◆복용법

1. 성행위 30분 ~ 60분전에 1 ~ 2알을 복용하시기 바랍니다.
2. 자양강장 정력증강으로서 : 2일 1회 1정을 복용하시기 바랍니다.
3. 고혈압이나 심장 질환이 있는 분은 복용을 삼가하시기 바랍니다.
또한 다른 의약품과의 동시 복용은 삼가하시기 바랍니다.

◆함유성분

쇄양, 인삼, 폴리페놀, 맥아, 흑설탕, 커피, 석류, 효소, 단백질

쇄양

쇄양은 성기능 상승, 자양 강장을 높이는 효과가 있습니다.

인삼

인삼은 혈류의 흐름을 좋게하는 효과가 있습니다.

혈류의 흐름이 좋아지는 것에 의해 발기력과 성욕의 상승으로 이어집니다

폴리페놀

남녀 모두의 혈액을 원활하게 하는 효과가 있으며 지방연소 촉진과 혈류 개선에 효과가 있습니다.

◆주의사항

일반 사탕과 같이 고온에서 보관하시면 녹아 버립니다.

냉장고나 햅볕이 닿지 않는 곳에 보관하시기 바랍니다.

◆성분효과설명

남성 정력제로 확실한 효과에서 큰 인기를 얻은 「NYC캔디(뉴욕캔디)」에서 여성용으로 최음 작용과 성욕 항진 작용하는 「NYC Pink (뉴욕캔디핑크)」 가 등장. 주성분인 쇄양, 인삼, 폴리페놀, 효소 등의 작용에 의해 혈류의 흐름을 좋게하고 여성의 성욕 항진에 작용합니다.

일시적으로 혈류의 흐름이 좋아지므로 뇌의 시상 하부에서의 성욕을 자극하는 중추 신경이 활발해지고 성욕의 항진, 최음 작용에 효과가 있다고 합니다.

◆복용법

1. 성행위 30분 ~ 60분전에 1 ~ 2알을 복용하시기 바랍니다.
2. 고혈압이나 심장 질환이 있는 분은 복용을 삼가하시기 바랍니다.
또한 다른 의약품과의 동시 복용은 삼가하시기 바랍니다.

◆함유성분

쇄양, 인삼, 폴리페놀, 맥아, 흑설탕, 커피, 석류, 효소, 단백질

RGM