

# 튜게인(TUGAIN)2 2%(여성용)

## ◆ 사용법

1. 1회 1ml을 1일 2회 탈모 두피에 사용하시기 바랍니다.
2. 탈모 범위의 크기에 관계없이 1회 1ml입니다.
3. 다양과 자주 사용해도 효과가 변함없이 부작용이 발현 될 수 있으므로 용량 및 용법을 지켜 사용하십시오.
4. 눈에 들어 가지 않도록 주의하시기 바랍니다.  
만일 사용중에 눈에 들어갔을 경우에는 즉시 물 또는 미지근한 물로 세척을 하시기 바랍니다.  
증상이 심한 경우에는 안과 의사의 진찰을 받으십시오.
5. 안경이나 화학 섬유등 알코올에 녹는 곳에는 사용하지 마십시오.
6. 헤어 스프레이 등을 사용할 때는 튜게인2가 완전히 마른 후 사용하십시오.
7. 헤어 컬러와 염색약을 사용하실 경우에는 염색 끝나고 나서 튜게인을 바릅니다.

## ◆ 부작용

- ★ 바르신 분위나 두피에 발진 발적, 가려움, 염증, 심한 비듬, 바른 부위의 부분이 열감의 부작용이 일어나는 경우가 있습니다.  
이 증상은 약이 맞지 않거나, 알레르기, 피부염 등의 증상이므로 사용을 중지하십시오.
- ★ 심장과 전신 혈관의 작용을 가진 약으로서 개발된 약품이므로 두통이나 졸도, 현기증, 심장 박동이나 가슴 통증 등의 부작용이 일어나는 경우가 있습니다.  
이는 도포한 약이 체내에 흡수되므로 약의 심장과 전신 부작용이 일으키는 상태입니다.  
위와 같은 증상이나 사용시에 원인을 알 수 없는 급격한 체중 증가, 손발의 부종, 극단적인 소변 양의 감소 등이 발생한 경우에는 전신 부작용의 가능성이 있기 때문에 바로 사용을 중지하시고 의료 기관을 진찰을 받으시기 바랍니다.

## ◆ 사용 및 병용금지

1. 미성년자는 사용할 수 없습니다.
2. 머리의 탈모의 종류와 모습에 따라 약이 맞지 않는 일이나 치료약이 아닌 것 등으로 사용할 수 없습니다.
3. 특히 장년기 탈모증이외의 탈모증(원형 탈모증, 갑상선 질환으로 인한 탈모등)의 분, 또는 원인을 알 수 없는 탈모증, 탈모가 급격히 시작하여 탈모 부위가 부분적으로 많으신 분은 사용하시는 것을 주의하시기 바랍니다.
4. 현재 약이나 화장품 등 알레르기 증상이 있던 분이나 고혈압, 저혈압이신 분, 심장 또는 신장 장애가 있는 분, 심한 부종이 있는 분, 65세 이상으로 갑상선 역기능이 있으시는 분은 사용할 수 있는지 사용전에 의사와 상담하시기 바랍니다.
5. 다른 의약품 외용제를 두피에 사용하고 계시는 분도 튜게인의 사용 가능 여부를 의사와 상담하십시오.

## ◆ 보관방법

1. 직사 광선, 고온 다습을 피하고 서늘한 곳에 보관하십시오.
2. 미성년자나 어린이의 손이 닿지 않는 높은 곳이나 열쇠 붙은 선반에 보관하십시오.
3. 장마철에는 습도가 높아 수분을 흡수하여 변화하는 경향이 있기 때문에 가능한 건조한 곳에서 보관하십시오.

RGM